

# COPFALL

Tanca el cicle vegetatiu



Accelera el procés metabòlic de la caiguda de fulles

Escurça el període de caiguda de fulles per no sobreexposar la planta a l'atac de patògens

Cicatritza les ferides dels peciols per evitar la infecció

Indueix al repòs: millora l'acumulació de reserves, l'aprofitament d'hores de fred i aconseguix una floració més homogènia

En viver afavoreix l'arrencada mecànica

Dosis d'aplicació	
Fruita d'os	5 - 10 L/ha
Fruita de llavor	7,5 - 15 L/ha
Patata i pebrot	8 - 10 L/ha
Ametller i kiwi	7,5 - 10 L/ha

- L'aplicació s'ha de fer a l'inici de la caiguda natural de les fulles per accelerar el procés i aconseguir els resultats desitjats.
- Acompanyar l'aplicació amb 1L/ha d'**AltensivpH** per aconseguir un pH òptim d'aplicació, millorar la penetració en els teixits, i augmentar la cobertura del fullatge augmentant l'efectivitat del tractament.

**Indefol**

Estimulant un descens progressiu de promotors de creixement (auxines, gibberelines i citoquinines), i un augment progressiu d'inhibidors (àcid abscísic i etilè), la tecnologia Indefol accelera la defoliació de la planta, millorant així la dormància de la mateixa i evitant possibles desordres fisiològics.



Pol. Ind. Pla d'Urgell, Nau 12 · Camí d'Arbeca s/n 25230 Mollerussa - Lleida (Spain)  
T. +34 973 712 113 · F. +34 973 712 444 | [www.altinco.com](http://www.altinco.com)

